

Tabla 44: Deficiencias de la extremidad inferior y pie según estimaciones basadas en el diagnóstico

Región y trastorno	Extremidad inferior (%)	Región y trastorno	Extremidad inferior (%)
Pelvis Fractura pélvica: No desplazada, no articular, consolidada, sin déficit neurológico ni otros signos Desplazada, no articular: evaluación mediante acortamiento y debilidad. Fractura acetabular: evaluación según movimiento y alteraciones articulares. Fractura de articulación sacroiliaca Bursitis isquial	0 — — 2 - 7 7	Cadera Sustitución total de la cadera: (tabla 45) Resultado bueno, 85 - 100 puntos Resultado regular, 50 - 84 puntos Resultado malo, < 50 puntos Fractura cuello del fémur consolidada en: Buena posición: Evaluación según la exploración. Mala unión (combinar con la deficiencia correspondiente por amplitud de movimiento). Ausencia de unión (combinar con la deficiencia correspondiente por amplitud de movimiento). Artroplastia de Girdlestone (si se evalúa según los hallazgos de la exploración se utilizará la puntuación mayor) Bursitis trocantérica crónica con marcha anormal.	37 50 75 — 30 37 50 7
Diáfisis femoral Fractura consolidada con angulación o defecto de rotación de: 10 - 14° 15 - 19° + de 20° (aumentar 2% por grado)	25 45 62 máximo	Tobillo Inestabilidad ligamentosa (basada en Rx de esfuerzo): Leve (exceso de apertura de 2-3 mm) Moderada (4-6 mm) Grave (> de 6 mm) Fractura extraarticular con angulación 10 - 14° 15 - 19° + de 20° :aumentar (2) [3] % por cada grado hasta un máximo de Fractura intraarticular con desplazamiento	(5) [7] (10) [14] (15) [21] (15) [21] (25) [35] (37) [53] (20) [28]
Rodilla Subluxación o luxación rotuliana con inestabilidad residual Fractura rotuliana No desplazada, consolidada Desplazamiento mayor de 3mm Desplazada con ausencia de unión Rotulectomía: Parcial Total Meniscectomía, medial o lateral: Parcial Total Meniscectomía, medial y lateral: Parcial Total Laxitud de lig. Cruzados o colaterales Leve Moderada Grave Laxitud de lig. Cruzados y colaterales Moderada Grave Fractura de la meseta tibial No desplazada Desplazada: 5 - 9° de angulación 10 - 19° de angulación +20° (aumentar 2% por grado) Fractura supra o intercondílea No desplazada Desplazada 5 - 9° de angulación 10 - 19° de angulación +20° (aumentar 2% por grado) Sustitución total de la rodilla (tbla 45): Resultado bueno: 85-100 puntos Resultado regular: 50-84 puntos Resultado malo: <50 puntos Osteotomía tibial proximal Resultado bueno Resultado malo: Estime la deficiencia según la exploración.	(7) (7) (12) (17) (7) (22) (2) (7) (10) (22) (7) (17) (25) (25) (37) (5) (12) (25) Máximo 50 (5) (12) (25) Máximo 50 (37) (50) (75) (25) —	Retropié Fractura extraarticular: · Con angulación en varo de 10 - 19° · Con angulación en varo de + de 20°: aumentar (1) [1]% por cada grado hasta un máximo de: · Con angulación en valgo de 10 - 19° · Con angulación en valgo > de 20°: aumentar (1) [1]% por cada grado hasta un máximo de: Pérdida del ángulo tibiocalcáneo · Ángulo de 120 - 110° · Ángulo de 100 - 90° · Ángulo < 90°: aumentar (2) [3]% por grado hasta un máximo de: Fractura intraarticular con desplazamiento · Subastragalina · Astragaloescaloidea · Calcaneocuboidea Deformidad del mesopié Cavo: · Leve · Moderada "Pie en mecedora" · Leve · Moderada · Grave Necrosis avascular del astrágalo · Sin hundimiento · Con hundimiento	(12) [17] (25) [35] (7) [11] (25) [35] (12) [17] (20) [28] (37) [54] (15) [21] (7) [10] (7) [10] (2) [3] (7) [10] (5) [7] (10) [14] 20) [28] (7) [10] (15) [21]
Tibia Fractura de diáfisis tibial con defecto de alineamiento de: 10 - 14° 15 - 19° +de 20°. (aumentar 2% por cada grado)	20 30 Max.50	Deformidad del antepié Fractura metatarsiana con desplazamiento dorsal de la cabeza > 5 mm: · Primer metatarsiano · Quinto metatarsiano · Otros metatarsianos Fractura metatarsiana con angulación plantar y metatarsalgia: · Primer metatarsiano · Quinto metatarsiano · Otros metatarsianos	(10) [14] (5) [7] (2) [3] (10) [14] (5) [7] (2) [3]