

Article 4

La resta de les vacunacions no es modifica. El Calendari de Vacunacions Sistemàtiques Infants de la Comunitat Valenciana queda reflectit en l'annex.

Article 5

Les vacunes incloses en el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques Infants s'administren gratuïtament en tots els punts de vacunació o les unitats establides per la Conselleria de Sanitat. Les vacunacions han de ser registrades en el Registre Nominal de Vacunes (RVN).

S'aprofitarà qualsevol contacte amb els serveis sanitaris, com els establits en el programa de salut del xiquet sa, a fi de no perdre oportunitats de vacunació i revisar l'historial de vacunacions.

DISPOSICIO FINAL PRIMERA

Es faculta la Direcció General de Salut Pública per a dictar les instruccions necessàries per a l'aplicació del calendari de vacunacions aprovat per esta orde.

DISPOSICIO FINAL SEGONA

Esta orde entra en vigor l'endemà de la publicació.

València, 14 de febrer de 2006

El conseller de Sanitat,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET

Artículo 4

El resto de las vacunaciones no se modifica. El calendario de vacunaciones sistemáticas de la Comunidad Valenciana queda reflejado en el anexo.

Artículo 5

Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil se administrarán de forma gratuita en todos los puntos de vacunación o unidades establecidas por la Conselleria de Sanidad y deben ser registradas en Registro Nominal de Vacunas (RVN).

Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios, como los establecidos en el programa de salud del niño sano, con el fin de no perder oportunidades de vacunación, y revisar el historial vacunal.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta a la Dirección General de Salud Pública a dictar las instrucciones necesarias para la aplicación del calendario de vacunaciones aprobado en la presente orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Esta orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Valencia, 14 de febrero de 2006

El conseller de Sanidad,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET

ANNEX / ANEXO

| Edat      | Hepatitis B1 | Poliomielitis injectable (VPI) | DTPa          | Varicel·la 2 | HIB     | Triple vírica | Meningococ C |
|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|
| En naixer | 1a dosi      |                                |               |              |         |               |              |
| 2 mesos   | 2a dosi3     | 1a dosi                        | 1a dosi       |              | 1a dosi |               | 1a dosi      |
| 4 mesos   |              | 2a dosi                        | 2a dosi       |              | 2a dosi |               |              |
| 6 mesos   | 3a dosi      | 3a dosi                        | 3a dosi       |              | 3a dosi |               | 2a dosi      |
| 15 mesos  |              |                                |               |              |         | 1a dosi       |              |
| 18 mesos  |              | 4a dosi                        | 4a dosi       |              | 4a dosi |               | 3a dosi4     |
| 6 anys    |              |                                | 5a dosi       |              |         | 2a dosi       |              |
| 11 anys   |              |                                |               | 1a dosi      |         |               |              |
| 14 anys   |              |                                | 6a dosi (Td)5 |              |         |               |              |

DTPa: diftèria, tètanus, pertussis acel·lular.

Td: tètanus diftèria, presentació d'adults.

1) Es completarà la pauta de tres dosis en tots els menors de 20 anys no vacunats.

2) Se n'ha d'administrar una sola dosi en xiquets i xiquetes sense antecedents de malaltia o vacunació.

3) Els fills de mares portadores del HBsAg han de rebre la segona dosi de vacuna contra l'hepatitis B al mes del naixement.

4) Se n'ha d'oferir la dosi de record als nascuts a partir de l'1 de gener de 2005.

5) Es recomana una dosi de record, amb vacuna Td cada 10 anys.

\*\*\*\*\*

| Edad     | Hepatitis B1 | Polio inyectable (VPI) | DTPa           | Varicela 3 | HIB      | Triple vírica | Meningococo C |
|----------|--------------|------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| A1 nacer | 1ª dosis     |                        |                |            |          |               |               |
| 2 meses  | 2ª dosis2    | 1ª dosis               | 1ª dosis       |            | 1ª dosis |               | 1ª dosis      |
| 4 meses  |              | 2ª dosis               | 2ª dosis       |            | 2ª dosis |               |               |
| 6 meses  | 3ª dosis     | 3ª dosis               | 3ª dosis       |            | 3ª dosis |               | 2ª dosis      |
| 15 meses |              |                        |                |            |          | 1ª dosis      |               |
| 18 meses |              | 4ª dosis               | 4ª dosis       |            | 4ª dosis |               | 3ª dosis4     |
| 6 años   |              |                        | 5ª dosis       |            |          | 2ª dosis      |               |
| 11 años  |              |                        |                | 1ª dosis   |          |               |               |
| 14 años  |              |                        | 6ª dosis (Td)5 |            |          |               |               |

DTPa: Difteria, tétanos, pertusi acelular.

Td: Tétanos difteria, presentación de adultos

1) Se completará la pauta de tres dosis en todos los menores de 20 años no vacunados.

2) Se administrará una sola dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.

3) Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna frente a la hepatitis B al mes del nacimiento.

4) Se ofertará la dosis de recuerdo a los nacidos a partir del 1 de enero de 2005.

5) Se recomienda una dosis de recuerdo, con vacuna Td cada 10 años.